Ataenius Corporaali, nov. sp. de Sumatra

par

A. Boucomont.

Ataenius Corporaali nov. sp. — Ferrugineus nitidus glaber. Capite tenuissime punctulato clypeo emarginato; thorace subquadrato antice latiore, angulis anticis foveolatis lateribus transversim breviter sulcatis, angulis posticis apice denticulatis, basi marginata; superficie punctata dimidia parte postica punctis magnis minutis intermixtis, antica gradatim minoribus et densioribus. Elytrorum lateribus parallelis sine dente humerali perspicuo, striis profunde punctatis interstitiis vix convexis apice excepto, punctulis minutissimis uniseriatim notatis, primo interstitio obliquo. Metasterno profunde sulcato, femoribus laevibus, metatarso postico tam longo quam aliis articulis conjunctim.

Long. 3.5 mill.

Sumatra O.K.: Bandar Baroe (Corporaal).

Cette espèce est reconnaissable à sa couleur d'un brun ferrugineux et à la forme du thorax qui est trapézoïdal, plus large en avant qu'en arrière, les fovéoles des angles antérieurs sont visibles de haut et font paraître ces angles explanés comme chez les *Euparia*, une autre petite impression transverse se trouve non loin des bords latéraux à égale distance des bords antérieur et postérieur; les côtés du thorax tombent verticalement, le bord latéral est rebordé et rectiligne, mais fortement sinué vers l'angle postérieur; la base est bordée d'un sillon large et profond; les angles postérieurs

sont légèrement obtus, leur sommet est terminé par une petite dent. Les sillons marginaux et les fovéoles du thorax sont couverts d'un enduit feutré ressemblant à une sciure de bois extrêmement fine, cet enduit est probablement naturel car il résiste au lavage à l'ammoniaque. La tête porte près des yeux une petite protubérance marquée d'une tache noire, les bords de l'échancrure clypéale sont arrondis. Les tibias antérieurs sont lisses en dessus, leur bord externe porte une série de courtes soies raides après les trois dents subapicales.